

УДК 594.141

Я. И. Старобогатов

О НЕКОТОРЫХ НАЗВАНИЯХ РОДОВОЙ ГРУППЫ В СЕМЕЙСТВЕ UNIONIDAE (BIVALVIA)

Как всем малакологам хорошо известно, во второй половине прошлого века французские малакологи, принадлежащие к «новой школе» (*école nouvelle*) описали весьма значительное число видов унионид. Вопрос о действительном числе видов, населяющих водоемы Европы, еще надлежит решить и, хотя ясно, что видов много меньше, чем принимали эти исследователи, оно все же, судя по морфологии глохидиев (Антонова, Старобогатов, 1989), заметно больше, чем принимается ныне в литературе, особенно в западноевропейской. Эти многочисленные виды унионид были сгруппированы во внутриродовые объединения (в пределах родов *Unio*, *Anodonta* и *Pseudanodonta*), для которых были предложены свои названия. Их, согласно Международному Кодексу зоологической номенклатуры, следует считать названиями родовой группы. Полный их список, кроме некоторых из названий, обсуждаемых ниже, приведен в номенклатуре Г. Вокса (Vokes, 1980). Все эти названия были предложены Ж. Бургинья, но он сам опубликовал только названия, относящиеся к роду *Anodonta* (Bourguignat, 1880—1881). Названия же, относящиеся к родам *Unio* и *Pseudanodonta*, и дополнительные названия к роду *Anodonta* были опубликованы на 8—9 лет позже (Locard, 1889, 1890). При этом исследователи из «новой школы» часто употребляли идентичные названия для подразделений разных родов, как двустворчатых, так и брюхоногих моллюсков, что создало многочисленные случаи гомонимии. И с вопросами синонимии названий видовой группы в пределах унионид, и с синонимикой названий родовой группы еще предстоит долго разбираться. Однако в ходе ревизии родов *Unio* и *Anodonta* небольшая часть этих названий вынужденно была уже использована (Старобогатов, 1970, 1977, Стадниченко, 1984). Это *Tumidusiana* Bgt. in Loc., 1889 и *Turtoniana* Bgt. in Loc., 1889 (как подродовые названия в роде *Unio*), *Crassiana* Bgt. in Loc., 1889 (как родовое название), *Batavusiana* Bgt. in Loc., 1889 (как подродовое в роде *Crassiana* — Старобогатов, 1977 или как родовое — Стадниченко, 1984), *Piscinaliana* Bgt., 1881 и *Ponderosiana* Bgt., 1881 (как подродовые названия в роде *Anodonta* или в роде *Colletopterum*).

При использовании этих названий родовой группы осталось однако незамеченным, что небольшое их число было впервые опубликовано (и притом без нарушений Кодекса) Ж. Сервеном (Servain, 1882) в работе, которую не заметили не только Г. Вокс (Vokes, 1980), но и составители Zoological Record. Это существенно меняет авторство и даты, а подчас и написание названий. Мне, благодаря любезности доктора Ф. Буше (Ph. Bouchet, Paris, Museum National d'Histoire naturelle), которому я приношу свою глубокую и искреннюю благодарность, удалось получить ксерокопию цитированной выше работы. В отношении внутриродовых группировок в роде *Anodonta* Ж. Сервен использует названия, опубликованные за год до этого Ж. Бургинья (Bourguignat, 1880—1881), тогда как названия в пределах рода *Unio*, опубликованные в 1882 г. Ж. Сервеном, имеют приоритет перед названиями, опубликованными в 1889 г. (Locard, 1889).

Всего в пределах рода *Unio* Ж. Сервен установил 6 названий родовой группы, из коих 2 являются младшими гомонимами и потому непригодны.

Пригодные названия

Crassiana Servain, 1882 non Bourguignat, 1884 (Gastropoda: Melanella-Amphimelania). Типовой вид (обозначен здесь): *Unio crassus* Philipsson, 1788.

© Я. И. СТАРОБОГАТОВ, 1993

Bataviana Servain, 1882. Типовой вид (обозначен здесь): *Unio cyprinorum* Bourguignat in Locard, 1882 = *Unio crassus* var. *irenjensis* Kobelt, 1912.

Galliciana Servain, 1882. Типовой вид (по монотипии): *Unio jourdheulli* Bourguignat in Locard, 1882.

Tumidiana Servain, 1882. Типовой вид (обозначен здесь): *Unio tumidus* Philipsson, 1788.

Младшие гомонимы

Limosiana Servain, 1882 non Servain, 1881 (Gastropoda: Lymnaea).

Rostratiana Servain, 1882 non Bourguignat, 1881 (Bivalvia; Anodonta).

Эти извлеченные из забвения названия родовой группы не так уж сильно меняют названия подродов и родов, тем более, что и к употреблявшимся ранее названиям еще пока не привыкли. Название *Crassiana* Serv., 1882 перестало быть младшим гомонимом названия, предложенного Ж. Бургинья (Bourguignat, 1884). Соответственно, следуя тому, как было принято ранее (Старобогатов, 1977), я придаю этому названию приоритет перед *Bataviana* Serv., 1882. Эти названия я использую, соответственно, как действительные названия рода (первое) и двух его подродов. *Crassunio* Jatzko, 1972 (два предыдущих акта его установления не сделали это название пригодным: Яцко, 1962 не обозначил типовой вид, а Modell, 1964 не дал диагноза) будет тогда младшим объективным синонимом *Crassiana*, а названия *Batavusiana* Bgt. in Loc., 1889 (с типовым видом *Unio crassus* var. *batavus* Mat. et Rack., 1805 = *Unio musivus* Spengler, 1793) и *Consentunio* Jatzko, 1972 (с типовым видом *Unio consentaneus* Rssm., 1836 = *Unio nanus* Lam., 1819 — о работе Яцко (1962) сказано выше) — младшими субъективными синонимами *Bataviana*. Название *Tumidiana* Serv., 1882 должно использоваться как действительное название одного из подродов рода *Unio*, тогда как названия *Tumidusiana* Bgt. in Loc., 1889 и *Tumidunio* Jatzko, 1972 (о работе Яцко (1962) см. выше) становятся его младшими объективными синонимами. *Pictunio* Jatzko, 1972 остается младшим объективным синонимом *Unio* Phil., 1788. Название *Galliciana* Serv., 1882 я использую как действительное название одного из подродов рода *Unio*. Соответственно, название *Turtoniana* Bgt. in Loc., 1889 (с типовым видом *Unio turtoni* Paygandeau, 1826) становится его младшим субъективным синонимом.

В 1939 г. П. Паллари (Pallary, 1939, p. 116) установил в пределах рода *Unio* секцию *Nemrodia*, охарактеризованную им весьма кратко (всего одной фразой). В нее он включил 5 видов (один новый) с несколькими разновидностями, не обозначив, однако, типового вида, что делает это название (с этим автором и датой) непригодным. В то же время при одном из видов он изменил это название (возможно, опечатка — см. Vokes, 1980) на *Nemrodiana*, и тем самым последнее название имеет свой типовой вид по монотипии, но опять же непригодно из-за отсутствия диагноза.

Для избежания номенклатурной путаницы и считая, что виды рода *Unio*, группирующиеся вокруг *U. tigridis* Bgt., заслуживают выделения в самостоятельный подрод, я даю диагноз этого подрода с соблюдением требований Международного Кодекса зоологической номенклатуры.

При этом мне представляется более целесообразным сохранить название *Nemrodiana*.

Подрод *Nemrodiana* subgen. n.

Типовой вид *Unio calliopsis* Kobelt, 1913

Раковина овально-прямоугольная; передняя часть створки короткая, равномерно закругленная, средняя (начиная от макушки и до сре-

дины длины участка между макушкой и задним концом) с почти параллельными спинным и брюшным краями, задняя часть клиновидная. Периостракум желтых тонов. Макушечная скульптура из бугорков, расположенных в несколько рядов, расходящихся от макушки и загибающихся к спинному краю спереди и сзади от нее. Передние (псевдокардинальные) зубы правой створки почти одинаковы по длине, но внутренний из них сильнее выдается в направлении левой створки, чем лежащий впереди него внешний; в левой створке внешний из передних зубов рудиментарный и хорошо заметен лишь у молодых особей.

- Антонова Л. А., Старобогатов Я. И. Родовые различия глохидиев наяд (*Bivalvia*, *Unionoidea*) фауны СССР и вопросы эволюции глохидиев // Тр. Зоол. ин-та АН СССР.— 1989 (1988).— 187.— С. 129—154.
- Стадниченко А. П. Перлівницеві, кулькові (*Unionidae*, *Cycladidae*).— К.: Наук думка, 1984.— 382 с.— (Фауна України; Т. 29. Моллюски. Вип. 9).
- Старобогатов Я. И. Фауна моллюсков и зоогеографическое районирование континентальных водоемов Земного шара.— Л.: Наука, 1970.— 372 с.
- Старобогатов Я. И. Класс двустворчатые моллюски *Bivalvia* // Определитель пресноводных беспозвоночных европейской части СССР (планктон и бентос).— Л.: Гидрометеиздат, 1977.— С. 123—151.
- Яцко И. Я. О филогенетических и стратиграфических соотношениях унионид по находкам на юго-западной территории УССР и МССР // Тр. Одесск. ун-та.— 1962.— 152, вып. 8.— С. 46—51.
- Яцко И. Я. Наяды верхнего кайнозоя юго-запада Украины и Молдавии.— Львов: Изд-во Львов. ун-та, 1972.— 144 с.
- Bourguignat J. R. Matériaux pour servir à l'histoire des Mollusques acephales du système européen.— Poissy: Impr. S. Lejay et Co, 1880/1881.— Т. 1.— 387 p.
- Bourguignat J. R. Histoire des melaniens du système européen.— Paris: Impr. Tremblay, 1884.— 168 p.
- Locard A. Catalogue des especes francaises appartenant aux genres *Margaritana* et *Unio* // Ann. Soc. Linn. Lyon.— 1889.— 35.— P. 111—269.
- Locard A. Catalogue des especes francaises appartenant aux genres *Pseudanodonta* et *Anodonta* // Ibid.— 1890.— 36.— P. 50—285.
- Modell H. Das naturliche System der Najaden. 3 // Arch. Mollusk.— 1964.— 86. N 3/4.— S. 71—126.
- Pallary P. Deuxieme addition a la faune malacologique de la Syrie // Mem. Inst. Egypte.— 1939.— 39.— P. 1—143.
- Servain G. Histoire des mollusques acephales des environs de Francfort.— Poissy: Impr. S. Lejay et Co., 1882.— 68 p.
- Vokes H. E. Genera of the *Bivalvia*: a systematic and bibliographic catalogue (revised and updated).— Ithaca: Paleont. res. inst., 1980.— 307 p.

Зоологический институт РАН
(199034 С.-Петербург)

Получено 17.05.92

ПРО ДЕЯКІ НАЗВИ РОДОВОЇ ГРУПИ В РОДИНІ UNIONIDAE (BIVALVIA).

Старобогатов Я. І.—Вестн. зоол., 1993, № 2.— На основі номенклатурних розшуків, пов'язаних з назвами родової групи, запровадженими в роботах Servain (1882) і Pallary (1939), запропонована номенклатура родів і підродів, які звичайно включаються до *Unio* s. l.

ON SOME GENUS GROUP NAMES IN THE FAMILY UNIONIDAE (BIVALVIA). Starobogatov Ya. I.—Vestn. zool., 1993, N 2.— Results of nomenclatorial studies of some genus group names within *Unio* s. l. published by G. Servain (1882) and P. Pallary (1939):

Genus *Crassiana* Serv., 1882=*Crassunio* Jatzko, 1972 (Jatzko, 1963 nom. nud., Modell, 1964 nom. nud.). Subgenera: *Crassiana* s. str.; *Bataviana* Serv., 1882=*Batavusiana* Bgt. in Loc., 1889, *Consentunio* Jatzko, 1972 (Jatzko, 1962 nom. nud.).

Genus *Unio* Phil., 1788=*Pictunio* Jatzko, 1972 (Jatzko, 1962 nom. nud.). Subgenera: *Unio* s. str.; *Tumidiana* Serv., 1882=*Tumidusiana* Bgt. in Loc., 1889, *Tumidunio* Jatzko, 1972 (Jatzko, 1962 nom. nud.); *Galliciania* Serv., 1882=*Turtoniana* Bgt. in Loc., 1889; *Nemrodiana* Star. subg. n.=*Nemrodia* Pallary, 1939 nom. nud., *Memrodiana* Pallary, 1939 nom. nud.